

# ACTA NEUROPSYCHIATRICA

OFFICIEEL WETENSCHAPPELIJK ORGAAN VAN HET I G B P  
(INTERDISCIPLINAIR GENOOTSCHAP VOOR BIOLOGISCHE PSYCHIATRIE)

**4<sup>e</sup> JAARGANG NUMMER 4 - DECEMBER 1992**

De TRF-test bij depressie: een literatuuroverzicht  
**F. Christiaens, M. Maes, E. Suy, P. Cosyns**

---

Congenitale afwijkingen door psychofarmacagebruik tijdens de zwangerschap  
**G. de Cuypere, Ph. Rombaut, M. van Moffaert**

---


De tussenbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de Hamilton Rating Scale for Depression  
**E. Hoencamp, I. Betten, P.M.J. Haffmans**

---

Neuroleptica: preklinische en klinische verschillen  
**B.A. Ellenbroek, A.R. Cools**

---

INDEX 1992



# D W A N G

IN GEDACHTEN EN HANDELING

H E T V E R T R O U W E N I N

<sup>®</sup>**ANAFRANIL**

clomipramine

als onderdeel van de behandeling

**Anafranil/Anafranil Retard 75 (Ciba-Geigy)** Samenstelling clomipramine (hydrochloride). Dragees à 10 en 25 mg. Anafranil Retard 75 tabletten met gereguleerde afgifte à 75 mg. Ampullen à 25 mg per 2 ml. Anafranil is een sterke niet-selectieve serotoninerge heropname remmer. **Indicaties** Depressies in engere zin; paniekstoornissen en/of fobieën. Obsessies en dwangneurosen (obsessieve compulsieve stoornis). **Contra-indicaties** Overgevoeligheid voor tricyclische antidepressiva uit de groep van de dibenzazepinederivaten. Acut myocardinfarct; gelijktijdig gebruik MAO-remmers. **Waarschuwingen/Voorzorgen** Oppassen bij glaucoom, lever- of nierinsufficiëntie, mictie stoornissen ten gevolge van belemmering van de urine afvoer, epilepsie, coronaire hartaandoeningen (manifeste insufficiëntie van hart en bloedsomloop), prikkelgeleidingsstoornissen (regelmatig ECG laten maken), orthostatische hypotensie. **Bijwerkingen** Anticholinerge nevenverschijnselen (zoals droge mond en accommodatiestoornissen). Soms allergische huidreacties (dan gebruik staken), zelden aritmieën, zeer zelden prikkelgeleidingsstoornissen. **Gebruik tijdens zwangerschap en lactatie** Bij voorkeur niet gebruiken. **Dosering** Depressies, fobieën, obsessies en dwangneurosen Orale dosering bij volwassenen: Aanvankelijk 2 tot 3 maal daags 25 mg, te verhogen tot 4 à 6 dragees van 25 mg per dag of 1 tot 2 maal daags 1 retard tablet à 75 mg. **Paniekstoornissen, Aanvangsdosering** 25 mg, in 3 tot 4 weken te verhogen tot 75-100 mg. Tijdens de eerste 2 weken van de behandeling kan soms verergering van de klachten optreden. Eventueel kan in dat geval de dosering verlaagd worden tot een dosis van 10 mg, welke vervolgens geleidelijk wordt verhoogd. De onderhoudsdosering is per individu en indicatie verschillend en varieert tussen 25 en 200 mg. Het is aan te bevelen, de therapie niet binnen 6 maanden te staken en om na die periode de medicatie te doen uitsluipen. Indien men bij het begin van de therapie deze combineert met een benzodiazepinederivaat, dient het benzodiazepinederivaat geleidelijk te worden vervangen door Anafranil. **Verpakkingsvorm:** Ampullen à 25 mg per 2 ml: 10 stuks. Dragees à 10 mg: 30 stuks. Dragees à 25 mg: 30 stuks. Retard tabletten à 75 mg: 30 stuks.

**Als eerste geregistreerd bij obsessies en dwangneurosen**

GEIGY farmaca, postbus 241, 6800 LZ Arnhem. Tel. 085-656200/656239

GEIGY